

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата Аподерм для лечения заболеваний поверхности кожи, копыт, когтей и дерматита, поверхностных ран и травм у животных

(Организация-разработчик: Laboratorios Ovejero S.A., Испания)

## I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Аподерм.

Международное непатентованное наименование: хлортетрациклин.

2. Лекарственная форма: спрей для наружного применения.

Состав. 100 мл раствора содержит:

Действующее вещество: хлортетрациклин хлоргидрат – 2,15 г (эквивалентно 2 г хлортетрациклина);

Вспомогательные вещества: хлорид магния - 4,0 г; пропиленгликоль - 8,66 мл; моноэтаноламин - 0,60 мл, краситель E131 - 0,2г, этанол 96% до 100 мл.

3. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 335 мл в алюминиевом баллоне под давлением с пластиковым распылительным вентилем и пластиковым колпачком.

4. Хранят Аподерм в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, вдали от огня (легковоспламеняющееся средство), отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечению срока годности.

5. Хранить препарат в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный ветеринарный препарат утилизируют в соответствии с законодательством.

## II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа: антибиотики-тетрациклины.

Действие хлортетрациклина основано на подавлении роста многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Streptococcus* spp., *Staphylococcus aureus*, *Escherichia* spp., *Shigella* spp., *Salmonella* spp., *Enterobacter* spp., *Pasteurella* spp., *Klebsiella* spp., *Leptospira* spp., *Listeria monocytogenes*, *Fusobacterium* spp., *Clostridium* spp., *Mycoplasma* spp., *Chlamydia* spp., *Haemophilus* spp., *Bacillus* spp., *Actinomyces bovis*, *Bordetella* spp., *Brucella* spp., *Treponema* spp., *Rickettsia* spp.

## III. Порядок применения

8. Аподерм применяют сельскохозяйственным и мелким домашним животным при различных поражениях кожи, таких как ссадины, дерматиты, экземы, медленно заживающие раны, а также при заболеваниях когтей и копыт (в том числе при нагноении роговой стрелки), межпальцевые инфекции, язвы.

9. Противопоказанием к применению препарата Аподерм является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного средства.

10. Перед применением препарата проводят санитарную обработку пораженной поверхности. Затем флакон встряхивают и, держа его вертикально, распыляют Аподерм на пораженный участок с расстояния 15-20 см от обрабатываемого участка.

Небольшие раны и/или царапины обрабатывают в течение 1-2 секунд один или два раза в сутки.

При заболеваниях когтей и/или копыт препарат распыляют 2 раза с промежутком 30 секунд 1 раз в сутки.

При дерматите кожи препарат распыляют 2 раза с интервалом 30 секунд 2 раза в сутки.

*Продолжительность лечения составляет от 3 до 8 дней, определяется ветеринарным врачом в зависимости от тяжести поражения и скорости заживления тканей.*

При лечении поражений в области головы следует избегать попадания лекарственного средства в глаза.

Обработку животных следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

11. Симптомов передозировок при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.

12. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных действий и осложнений, как правило, не наблюдается. У чувствительных особей, за исключением индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам лекарственного средства, возможны аллергические реакции.

13. Молоко продуктивных животных в период и после применения Аподерма разрешается использовать в пищевых целях без ограничений. В случае вынужденного убоя животного, обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

#### **IV. Меры личной профилактики**

14. Специальные меры предосторожности при работе с препаратом не требуются.

15. При применении лекарственного препарата Аподерм следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

16. При случайном попадании препарата на слизистые оболочки, пораженный участок необходимо тотчас промыть проточной водой. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Легковоспламеняющееся средство. Запрещается разбирать, прокалывать и сжигать баллон после использования препарата. Баллон подлежит утилизации с бытовыми отходами.

17. Организация-производитель: Laboratorios Ovejero S.A. / Лабораториос Овейеро С.А., адрес: Стра. Леон-Вилеча, 30, 24192- Леон, Испания

Адрес места производства лекарственного средства: «Laboratorios Ovejero S.A.», Ctra. León – Vilecha 30, 24192- León, Spain

Инструкция разработана: Laboratorios Ovejero S.A. / Лабораториос Овейеро С.А., Испания, совместно с ООО «Ареал Био» (г. Москва, РФ).

Номер регистрационного удостоверения РК-ВП-4-2493-13