

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мамифорта Секадо для лечения и профилактики мастита у коров в сухостойный период

(Разработчик фирма «Laboratorios SYVA s.a.u.», Испания)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мамифорт Секадо (Mamifort Secado).

Международное непатентованное наименование: ампициллина тригидрат, клоксациллина бензатин.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

Мамифорт Секадо в 1 шприце в качестве действующего вещества содержит ампициллина тригидрат – 250 мг и клоксациллина бензатин – 500 мг и вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол – 1,6 г, алюминия моностеарат – 240 мг и жидкий парафин – до 8 г.

По внешнему виду препарат представляет собой суспензию белого цвета.

3. Мамифорт Секадо выпускают расфасованным в шприцы-дозаторы по 8 г, упакованных в картонные коробки или полиэтиленовые ведра вместе с инструкцией по применению.

4. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 4°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года с даты производства.

Запрещается применение Мамифорта Секадо после истечения срока годности.

5. Мамифорт Секадо следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Мамифорт Секадо относится к группе антибактериальных комбинированных лекарственных препаратов.

Входящая в состав Мамифорта Секадо комбинация полусинтетических пенициллинов – ампициллина и клоксациллина – и специальная основа обеспечивают пролонгированное действие лекарственного препарата в течение 4 недель в отношении большинства возбудителей мастита, выделяемых из секрета вымени коров в сухостойный период, в том числе стрептококков, стафилококков, клостридий, включая штаммы, резистентность которых к пенициллину обусловлена β-лактамазой.

Бактерицидное действие ампициллина и клоксациллина основано на ингибировании транспептидазы и карбоксипептидазы микроорганизмов, что препятствует синтезу клеточной стенки бактерий, приводит к нарушению осмотического баланса и гибели бактерий.

Мамифорт Секадо по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

8. Мамифорт Секадо назначают коровам в сухостойный период для лечения и профилактики мастита бактериальной этиологии.

9. Противопоказанием к применению является гиперчувствительность животного к антибиотикам группы пенициллинов. В случае появления аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты или другое симптоматическое лечение.

Мамифорт Секадо запрещается применять коровам в период лактации и менее чем за 42 дня до отела, ввиду длительного выделения клоксациллина с молоком. В случае, если препарат был ошибочно введен лактирующим коровам, молоко нельзя использовать в пищу в течение 46 суток.

10. Мамифорт Секадо вводят коровам после последней дойки перед переводом в сухостойный период, но не позднее, чем за 42 дня до предполагаемого отела, однократно, интрацистернально, по 8 г (содержимое шприца-дозатора) в каждую четверть вымени.

Перед обработкой лекарственным препаратом молоко от больных четвертей вымени выдаивают и утилизируют, сосок обрабатывают дезинфицирующим раствором. Канюлю инъектора вводят в канал соска и осторожно выдавливают содержимое в пораженную четверть вымени. Вынимают инъектор и пальцами пережимают сосок на 1-2 минуты. Проводят легкий массаж соска для лучшего распределения препарата.

11. Симптомы передозировки не выявлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Мамифорт Секадо предназначен для однократного применения.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Мамифорта Секадо в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.

15. Мамифорт Секадо не следует назначать одновременно с другими антибактериальными препаратами для интрацистернального введения.

16. В пищевых целях молоко разрешается использовать не ранее, чем через 120 часов после отела. Молоко, полученное после отела коров до истечения установленного срока, разрешается использовать после кипячения в корм животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего введения. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

17. При применении Мамифорта Секадо необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мамифортом Секадо. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация производитель: фирма «Laboratorios SYVA s.a.u.», Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57, 24010 Leon, Spain.

Инструкция разработана фирмой «Laboratorios SYVA s.a.u.» (Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57, 24010 Leon, Испания) совместно с ООО «Круз» (109428, Россия, Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.14, этаж 13).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 21.04.2011 года