



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МАСТИКЛОКС Л

Ампициллин натрия, клоксациллин натрия
интрамаммарная суспензия для коров

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мастиклокс Л (Masticlox L).
Международное непатентованное наименование: Ампициллин натрия, клоксациллин натрия..
2. Лекарственная форма: интрамаммарная суспензия.
Состав:
В 5 г мл препарата содержатся активные компоненты: Ампициллин натрия 75 мг, клоксациллин натрия 200 мг. Наполнители: жидкий парафинг, белый вазелин.
3. По внешнему виду ветеринарный препарат Мастиклокс Л представляет собой интрацистернальную суспензию от белого до желтоватого цвета.. Он выпускается расфасованным в препарат выпускают в шприцах из полиэтилена низкой плотности. Каждый отдельный шприц содержит 5 г продукта. Шприцы упаковывают по 4 в картонную коробку.
4. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 1 год от даты производства.
Запрещается использование препарата после истечения срока годности.
5. Хранить препарат следует в сухом и прохладном месте, при температуре от 5 °С до 25 °С, в защищенном от света месте.
6. Ветеринарный препарат Мастиклокс Л следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. В случае истечения срока годности неиспользованный ветеринарный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Препарат предназначен только для целевых животных.

II. Фармакологические свойства

9. Ветеринарный препарат Мастиклокс Л относится к антибактериальным препаратам. Фармакотерапевтическая группа: Антибактериальные средства для интрамаммарного применения, β-лактамы антибиотики, комбинации пенициллина. Код ATCvet: QJ51CR50. Препарат предназначен для лечения инфекций во время лактации, вызванных грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами, чувствительными к ампициллину и клоксациллину.
Ампициллин и клоксациллин относятся к группе β-лактамов антибиотиков. Их механизм действия основан на ингибировании биосинтеза бактериальной клеточной стенки при ослаблении активности транспептидазы, фермента, ответственного за образование поперечных связей между цепями пептидогликана. Клоксациллин относится к группе изоксалил пенициллина, устойчивой к пенициллиназам.
Препарат, вводимый через сосковый канал молочной железы в виде суспензии, слабо абсорбируется в кровотоки и действует в основном локально.

III. Порядок применения

10. Целевые виды животных: целевые животные - крупный рогатый скот (коровы во время лактации).
11. Показания к применению:
Лечение инфекций во время лактации, вызванных грамположительными и

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТА
ds. ROZWOJU

mgr inż. *Lukasz Wolszczak*

DRWALEWSKIE
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
BIOWETERYNARYJNEGO
Spółka Akcyjna
06-651 Drwalew ul. Grójecka 6



грамотрицательными микробами, чувствительных к ампициллину и клоксациллину, в частности *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus agalactiae*, чувствительные виды *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *E.coli*, включая резистентные к пенициллазам.

12. Дозировка и способ применения:

Дозы и способ введения - Мاستилокс Л вводится следующим образом: один шприц (5 г) на инфицированную четверть молочной железы, повторяйте процедуру три раза каждые 12 часов.

Перед тем, как вводить лекарство, четверть должна быть тщательно обработана, очищена и продезинфицирована до конца соска. Снимите колпачок с шприца, вставьте конус в канал соска и медленно вводите препарат до тех пор, пока упаковка не станет пустой.. Затем распределите препарат в верхней части вымени, аккуратно массируя всю четверть.

13. Противопоказания: Не используйте этот продукт у животных, страдающих аллергией на пенициллин.

14. Особые меры предосторожности для использования у животных: Использование препарата должно основываться на исследованиях чувствительности и учитывать официальные и местные принципы антибактериальной терапии. Неправильное использование продукта может вызвать распространение бактерий, устойчивых к ампициллину и клоксациллину, и снизить эффективность лечения другими β -лактамными антибиотиками из-за перекрестной резистентности.

15. Побочные реакции: Могут возникать аллергические реакции.

16. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Известных взаимодействий Мастиклокс Л с другими лекарственными средствами нет, а также других форм взаимодействия нет.

17. Период ожидания: Съедобные ткани - 7 дней, Молоко - 60 часов..

IV. Меры личной профилактики

18. Пенициллины и цефалоспорины могут вызывать аллергические реакции после парентерального введения, случайного проникновения в дыхательные пути, потребления и контакта с кожей. Гиперчувствительность к пенициллину может привести к перекрестной гиперчувствительности к цефалоспорином и наоборот. В некоторых случаях аллергическая реакция на эти вещества может быть серьезной.

Лица с известной гиперчувствительностью или люди, которым было рекомендовано не вступать в контакт с такими веществами, не должны касаться этого продукта.

Следует обращаться с препаратом с осторожностью, принимая все рекомендуемые меры предосторожности во избежание случайного воздействия препарата.

Если в результате случайного контакта с препаратом появились такие симптомы, как кожная сыпь, необходимо проконсультироваться с врачом, показав упаковку или информационный лист. Отек лица, рта, вокруг глаз или затрудненного дыхания представляет собой гораздо более серьезные симптомы и может потребовать немедленной медицинской помощи.

Мойте руки после работы с препаратом.

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-4239-20

Организация-производитель: Biowet Drwalew S.A. (А. О. «Дрвалевские Предприятия Биоветеринарной Промышленности») 05-651 г. Дрвалев, ул. Груецка 6, Польша.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. ROZWOJU

mgr inż. Łukasz Wolszczak

DRWALEWSKIE
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
BIOWETERYNARYJNEGO
Spółka Akcyjna
06-651 Drwalew ul. Grójecka 6