

АЙНИЛ (КЕТОПРОФЕН) - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, 100 МЛ

Для КРС, лошадей и свиней. Противовоспалительный препарат используется в качестве лечебного препарата против травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, болевых синдромов, жара. В комплексе с бактерицидным препаратом используется для лечения инфекций респираторного тракта и гнойно-некротического поражения конечностей.

Описание

Противовоспалительный препарат используется для крупного рогатого скота, лошадей и свиней.

Раствор для инъекций.

Форма выпуска

Стекланный флакон - 100 мл.

Состав

Кетопрофен – 100 мг, бензиловый спирт – 10 мг, наполнитель – 1 мг.

Свойства

- Не имеет местно-раздражающего, сенсibiliзирующего, мутагенного, канцерогенного, эмбриотоксического и тератогенного свойств.
- Имеет противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее свойства.

Показания

Используется для крупного рогатого скота, лошадей и свиней в качестве лечебного препарата против травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, болевых синдромов, жара. В комплексе с бактерицидным препаратом используется для лечения инфекций респираторного тракта и гнойно-некротического поражения конечностей.

Применение и дозировка

- Крупный рогатый скот – ввести в/в или в/м - 3 мл на 100 кг массы животного 1 раз/сут 1-3 дня;
- Спортивная лошадь – ввести в/в 1 мл на 45 кг массы, 1 раз/сут 3-5 дней; от симптоматических колик - 1 мл на 45 кг массы 1 раз;
- Свинья – ввести в/м 3 мл на 100 кг, 1 раз/сут 1-3 дня.

Особые указания

Не применять одновременно в сочетании с антикоагулянтами, диуретиками, противовоспалительным, глюкокортикоидными средствами.

Противопоказания

Не применять препарат в случае:

- чувствительности к составным компонентам средства;
- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
- выраженной почечной и печеночной недостаточности.

Период ожидания

Убой крупного рогатого скота на мясо производить не раньше 5 дней, свиней - 4 дней после последнего приема препарата. Мясо животных убитых до истечения данного периода, использовать для кормления зверей.

Меры предосторожности

- В процессе работы с препаратом использовать резиновые перчатки.
- Избегать попадания в глаза.

Правила хранения

- Хранить в закрытой таре, вдали от продуктов питания и корма.
- Не допускать попадания солнечного света.
- Температура хранения +5°- +25°С.

Срок годности – 2 года. Срок годности препарата после открытия флакона – 7 дней.