



УТВЕРЖДАЮ

Президент Chemifarma S.p.A.

 Riccardo Romagnoli

« » 202_ год

08 AUG 2024

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки АНПРОСОЛ AD₃E+Ca

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 АНПРОСОЛ AD₃E+Ca (ANPROSOL AD₃E+Ca) – кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птицы на основе водорастворимых витаминов и кальция глюконата.

1.2 В 1 л кормовой добавки содержится: витамин А – 20 000 000 МЕ, витамин D₃ – 200 000 МЕ, витамин Е – 10 000 мг, кальций (в форме глюконата) – 2 000 мг, вспомогательные вещества: макроголглицерина триолеат, вода.

Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

1.3 По внешнему виду АНПРОСОЛ AD₃E+Ca представляет собой прозрачную желтоватую жидкость, хорошо растворимую в воде.

1.4 АНПРОСОЛ AD₃E+Ca расфасована в канистры из полимерных материалов по 5 и 10 л, пластиковые флаконы по 100 мл и 1 л, укупоренные закручивающимися крышками.

Хранят в закрытой упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5 °С до +25 °С. Срок хранения в оригинальной упаковке и при соблюдении температурного режима – 18 месяцев. Хранить в местах, недоступных для детей.

1.5 Не применять АНПРОСОЛ AD₃E+Ca по истечении срока годности.

2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Витамин А, содержащийся в АНПРОСОЛ AD₃E+Ca, необходим для процесса роста и развития сельскохозяйственных животных и птицы; в организме участвует в клеточном обмене, защите эпителиальных тканей при их развитии и функционировании; повышает резистентность слизистых оболочек к инфекции; способствует синтезу гликопротеинов, формирующих клеточную мембрану; участвует в процессе зрения, в виде ретиналя формирует зрительные пигменты; влияет на репродуктивные функции сельскохозяйственных животных и птицы. При недостатке витамина А в организме сельскохозяйственных животных и птицы наблюдается: снижение скорости роста, угнетенное состояние, нервные расстройства, у птицы – взъерошенность оперения.

Витамин D₃ в своей активной форме ведет себя как стероидный гормон, регулирует образование кальцийсвязывающего белка, тем самым регулирует метаболизм кальция и непрямым образом метаболизм фосфора в трех органах-мишенях: в кишечнике он способствует абсорбции, в почках – реабсорбции, в костях – несет ответственность за поддержание целостности костной ткани, контролируя процессы минерализации. Действие витамина D₃ всегда направлено на кальций – регулируя его концентрацию.

Витамин Е является биологическим антиоксидантом, формируя типичную окислительно-восстановительную систему. Благодаря такой способности витамин Е принимает участие в механизмах предупреждения серьезных нарушений, которые могут появиться из-за воздействия свободных кислородных радикалов на важные биологические соединения, такие как фосфолипиды мембран, белки и нуклеиновые кислоты. Повреждение этих структур – одна из основных причин многих патологий, особенно сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Витамин Е контролирует синтез простагландинов с агрегирующими свойствами – с сохранением целостности красных кровяных клеток, предупреждая гемолиз. Витамин Е выполняет защитную функцию по отношению к определенным активностям ферментов. При недостатке витамина Е наблюдается энцефаломалиция, экссудативный диатез, миодистрофия. У самцов может возникнуть бесплодие, вызванное дистрофией яичек.

Кальция глюконат – источник восполнения дефицита ионов кальция, необходимых для осуществления процесса передачи импульсов, сокращения скелетных и гладких мышц, деятельности миокарда, формирования костной ткани, свертываемости крови. При недостатке кальция, циркулирующего в крови, происходит кальцификация двигательного аппарата, т.е. у молодняка животных и птиц развивается рахит, у взрослых особей – остеопороз.

Учитывая вышеперечисленное, ввод кормовой добавки АНПРОСОЛ AD₃E+Ca, благодаря высокой биодоступности ее компонентов, позволяет поддерживать баланс кальция в организме, защищает клетки эпителия от агрессивных радикалов.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 АНПРОСОЛ AD₃E+Ca участвует в защите эпителиальных клеток, механизмах иммунного реагирования, в процессах роста и развития сельскохозяйственных животных и птицы.

3.2 АНПРОСОЛ AD₃E+Ca применяют перорально с водой ежедневно в течение 5-7 дней из расчета:

– сельскохозяйственной птице: 50 мл на 100 л воды в сутки;

– пороссятам, свиньям: 80 мл на 100 л воды.

В период технологических стрессов и реконвалесценции, доза может быть увеличена у сельскохозяйственной птицы до 60 мл, у свиней и поросят – до 100 мл.

При необходимости курс повторить через 7 дней.

3.3 Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением с учетом суточного потребления жидкости и необходимой концентрации.

3.4 Осложнений и побочных явлений при применении АНПРОСОЛ AD₃E+Ca в соответствии с данной инструкцией по применению не выявлено.

3.5 Не применять кормовую добавку в системе поения совместно с вакцинами перорального потребления, органическими кислотами.

3.6 АНПРОСОЛ AD₃E+Ca содержит витамины, для которых отсутствует период ожидания, т. е. продукцию от сельскохозяйственных животных и птицы можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Использовать средства индивидуальной защиты: защитную маску или респиратор, защитные очки, перчатки.

4.2 При случайном попадании добавки на кожу или слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения кормовой добавки, ее использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животного или несоответствии кормовой добавки по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия кормовой добавки нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Производитель: Чемифарма С.п.А. (Chemifarma S.p.A.).

Юридический адрес (адрес производства): Виа Дон Еугенио Сервадей 16, 47122 Форли, Италия
(Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forlì, Italia).