

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам

протокол от «23» декабря 2021 г. № 118.

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного препарата «Ципромет»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ципромет (Cyprometum).

Международное непатентованное наименование активных фармацевтических субстанций: ципрофлоксацин, триметоприм.

1.2 Ципромет представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, допускается легкая опалесценция раствора.

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг ципрофлоксацина, 50 мг триметоприма, вспомогательные вещества: спирт бензиловый, вода очищенная.

Лекарственная форма: раствор для орального применения.

1.3 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50, 100, 200 мл, полимерных флаконах по 20, 100, 500, 1000 мл и полимерных канистрах по 5000 мл.

1.4 Ципромет хранят по общему списку при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, в защищенном от света месте. Не допускается замораживание препарата и транспортировка при температуре ниже плюс 5°С.

1.5 Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных для детей.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Ципромет – комплексный противомикробный препарат.

2.2 Ципрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром противомикробного действия. Ципрофлоксацин активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Chlamydia spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Mycobacterium spp.* и др.

Механизм действия ципрофлоксацина связан с блокадой фермента ДНК-гиразы, что ведет к нарушению синтеза ДНК, а также нарушению роста и деления бактерий. Ципрофлоксацин также вызывает выраженные морфологические изменения (в том числе клеточной стенки и мембран) и быструю гибель бактериальной клетки.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат, оказывающий бактерицидное действие в отношении *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.* и др.

Механизм действия триметоприма связан с угнетением фермента дигидрофолатредуктазы в процессе синтеза тетрагидрофолиевой кислоты.

2.3 После орального применения компоненты препарата быстро всасываются из желудочно-кишечного тракта и проникают во все органы и ткани животных. Терапевтическая концентрация в организме сохраняется в течение 12 – 18 часов.

2.4 Препарат выводится из организма с желчью и мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Ципромет применяют свиньям, телятам и птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, гемофилезе, микоплазмозе, стафилококкозе и других инфекционных заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

3.2 Препарат применяют в следующих дозах:

– свиньям и телятам: 0,25 – 0,5 мл на 10 кг массы тела животного с питьевой водой 2 раза в сутки в течение 3 – 5 дней;

– птице (цыплятам-бройлерам, курам-несушкам, ремонтному молодняку, племенной птице): 500 – 1000 мл на 1000 л воды групповым методом или 0,05 – 0,1 мл на 1 кг массы тела птицы в течение 3 – 5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней.

3.3 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и осложнений.

3.4 Противопоказано совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклинами, макролидами и амфениколами), теофиллином, стероидами, непрямыми антикоагулянтами. Прием совместно с железосодержащими препаратами, сульфатом и антацидными препаратами, содержащими магний, кальций и алюминий, приводит к снижению всасывания ципрофлоксацина, поэтому его следует назначать за 1 – 2 часа до или через 4 часа после приема вышеуказанных препаратов.

3.5 Препарат противопоказан при нарушениях функции почек, печени, повышенной чувствительности к фторхинолонам.

3.6 Запрещается применение препарата курам-несушкам, чье яйцо используется в пищу людям.

3.7 Убой животных на мясо разрешается через 14, птицы – через 12 дней после последнего назначения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005 г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ООО «Промветсервис» (юридический адрес): 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, 12/2а, тел./факс: +375 17 503-53-67.

Производитель: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская ½, тел./факс: +375 1770 27081.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (Ятусевич И.А., Смаглей Т.Н.), внутренних незаразных болезней животных (Иванов В.Н.), НИИ ПВМ и Б (Фомченко И.В.) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «Промветсервис» (Дмитриева А.А., Степанюга М.А.).

