

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Тимпанолола
для лечения тимпаний у жвачных животных

(Организация-разработчик: ЗАО «НПП «Фармакс»,
610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тимпанол (Timpanolum).

Международное непатентованное наименование: отсутствует.

2. Лекарственная форма: эмульсия для внутреннего применения.

Тимпанол в 100 мл в качестве действующих веществ содержит: алкалоиды Чемерицы Лобеля - 0,0040 - 0,0060 % (в пересчете на протовератрин), сесквитерпеновые лактоны Полыни горькой травы - не менее 0,012 %, в качестве вспомогательных веществ: кремния двуокись 0,019 г, кремнеорганический пеногаситель 0,93 г, молочную кислоту 3,0 г, поливиниловый спирт 2,45 г, воду дистиллированную или питьевую до 100 мл.

3. По внешнему виду препарат представляет собой жидкость от серого до желто-зеленого цвета со специфическим запахом (при хранении допускается образование осадка, исчезающего при встряхивании).

Срок годности Тимпанолола в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения — 18 месяцев с даты производства.

Запрещается применять Тимпанол после окончания срока годности.

4. Выпускают Тимпанол расфасованным по 200 мл во флаконы из медицинского стекла с навинчивающимися крышками; по 200, 330, 500, 1000 мл в полимерные флаконы с навинчивающимися крышками.

Каждую единицу фасовки сопровождают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 до 20° С.

6. Тимпанол следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тимпанол относится к группе препаратов, влияющих на пищеварительный тракт.

10. Тимпанол препятствует газообразованию, разрушает образовавшиеся пузырьки газа, оказывает антисептическое и руминаторное действие, усиливает секрецию и перистальтику пищеварительного тракта; расслабляет тонус сфинктеров преджелудков, что обеспечивает быстрое продвижение содержимого по желудочно-кишечному тракту.

По степени воздействия на организм Тимпанол согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Тимпанол применяют для лечения тимпаний у жвачных животных.

12. Противопоказанием к применению Тимпанолола является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. Тимпанол вводят перорально при помощи резиновой бутылки или пищевода зонда непосредственно в полость рубца.

Тимпанол назначают в дозах:

крупному рогатому скоту – 0,4 – 0,5 мл/кг массы тела животного;

козам и овцам – 0,5 – 1,0 мл/кг массы тела животного.

Перед применением Тимпанол разводят водой в соотношении 1:10 – 1:15, предварительно взболтав до получения однородной жидкости.

Если симптомы болезни не исчезают в течение 15 – 20 минут после введения Тимпанола, препарат вводят животному повторно в тех же дозах, но в разведении 1:5 – 1:10.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Противопоказания и особенности применения препарата беременным и лактирующим животным, а также возрастные ограничения отсутствуют.

17. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы, применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Тимпанола в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные препараты.

19. Тимпанол можно назначать в сочетании с другими лекарственными препаратами.

20. Продукцию животного происхождения, полученную во время и после применения Тимпанола, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Тимпанолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. При работе с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к Тимпанолу следует избегать прямого контакта с препаратом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать в бытовых целях, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ЗАО «НПП «Фармакс», 610033, Россия, г. Киров, ул. Солнечная, д. 7.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Тимпанола, утвержденная Россельхознадзором 25 декабря 2013 г.

Номер регистрационного удостоверения 24-3-15,14-39591/76P-3-0,2/01129